



ICONOGRAFÍA

ALIMENTACIÓN	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA
HERVÍVORO			
GRANÍVORO		INSECTÍVORO	CARROÑERO
HÁBITAT	CUERPOS DE AGUA	PÁRAMO	BOSQUE HÚMEDO
	BOSQUE SECO	BOSQUE MONTANO	
ESTRATO FORRAJE	AÉREO	SUELO	DOSEL
	SOTOBOSQUE	ACUÁTICO	
RIESGO DE EXTINCIÓN	PELIGRO CRÍTICO (CR)	PELIGRO (EN)	VULNERABLE (VU)
	(NT) CASI AMENAZADA	PREOCUPACIÓN MENOR (LC)	

EDICIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN

Claudia Bibiana Moreno Mojica
James Anker Murillo
Luis fernando Cáceres
Elkin René Briceño

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Alejandra Bonilla Jaimes
Diseñadora Gráfica



Colibrí ventricastaño


Amazilia castaneiventris (Gould, 1856)
Trochilidae

Dorso bronce rojizo; vientre rufo; rabadilla ante grisáceo; garganta y pecho verde iridiscente; alas castaño purpúreo y bordes negruzcos. La hembra presenta vientre claro y banda blanca en la parte superior de la garganta.

Distribución: ENDÉMICA. 500-2200 m. Distribución muy restringida. Reportado en el valle del Magdalena Medio. Sin embargo, en Santander existen reportes al centro oriente del departamento entre los municipios de San Vicente de Chucurí y Curití.

Ecología: Comportamiento territorial. Su reproducción es de diciembre a febrero. Se beneficia de la apicultura ya que promueve la siembra de vegetación melífera.

Amenazas: Modificación y destrucción de hábitat



Tamaño: 8,4 cm

FOTOGRAFÍA: ProAves/www.proaves.org

Carpintero hermoso

Melanerpes pulcher (Salvin, 1870)
Picidae


Corona de color rojo en el macho y negra en la hembra. Nuca y frente amarillos; pico negro y patas grises; garganta y pecho color ante; centro del vientre rojo anaranjado; amplia línea central blanca en el dorso negro.

Distribución: ENDÉMICO. 250-1500m. Se distribuye en el centro del país en el valle del Magdalena Medio y en el costado Nororiental de la cordillera central.

Ecología: Vive en pareja o grupos hasta de 6 individuos. Construye el nido en alturas de 5 a 30 m dentro de troncos, la pareja permanece junta en el nido y empolla de 3 a 4 huevos.

Amenazas: Modificación de hábitat.

FOTOGRAFÍA: Libro de diálogos de Autor



Tamaño: 18 y 20,3 cm

Inca negro


Coeligena prunellei (Bourcier, 1843)
Trochilidae

Plumaje negruzco con manchas blancas a los lados del pecho. Hombros azul iridiscente. Garganta con parche azul verdoso. Cola negra con borde blanco en las plumas debajo de las coberteras.

Distribución: ENDÉMICA. 1400-2600 m. Registrado al occidente de la cordillera oriental desde el suroriente de Santander y occidente de Boyacá, hasta el occidente de Cundinamarca.

Ecología: Observado generalmente en bosque maduro, sin embargo, también en un parque abierto y bosque de galería ribereño. Se reproduce entre junio y octubre. Favorece plantas con flores pendulares y corolas tubulares largas.

Amenazas: - Modificación y destrucción de hábitat.



Tamaño: 10,9 cm

FOTOGRAFÍA: ProAves/www.proaves.org

Hormiguero pico de hacha.


Clytocantantes alixii (Elliot, 1870)
Thamnophilidae

Macho gris con frente, cara, garganta y pecho color negruzco; alas con pequeños puntos blancos. Hembra con dorso castaño más oscuro en alas; el pecho y vientre castaño rojizo y la cola oscura.

Distribución: 180-1000 m. Habita en el alto Río Sinú y partes bajas del Valle del Cauca, al oriente del valle del Magdalena Medio.

Ecología: Habita en tierras bajas y bosques de piedemonte, se beneficia de la maleza densa, matorrales, bordes de bosques y el crecimiento secundario joven.

Amenazas: - Destrucción de hábitat.



Tamaño: 16 cm

FOTOGRAFÍA: ProAves/www.proaves.org

Torito capiblanco


Capito hypoleucus (Salvin, 1897)
Capitonidae

Frente escarlata, cuello corto blanco amarillento, pico azulado en la punta. Corona y manto de blanco y negro. Partes inferiores de color blanco amarillento.

Distribución: ENDÉMICA. 200-1500 m. Registrado en Valle del Cauca, cabecera del río Nechí, norte de la cordillera central y sur del Valle del Magdalena Medio.

Ecología: Habita en bosque maduro y ocasionalmente en bordes y claros de bosque, vegetación secundaria y agroecosistemas. Forma parejas o grupos hasta de siete individuos, desplazan con vuelos cortos y vocalizando constantemente.

Amenazas: - Modificación de hábitat.



Tamaño: 19 cm

FOTOGRAFÍA: ProAves/www.proaves.org

Tapaculo del Alto Magdalena

Scytalopus rodriguezi (2005)
Rhinocryptidae

Predominantemente gris pizarra con el vientre de color ante marrón. Carece de dimorfismo sexual en el plumaje.

Distribución: ENDÉMICO. 1900-2400 m. Se restringe al costado occidental de la cordillera oriental en el Magdalena Medio. Existen registros en la Serranía de los Yariquies.

Ecología: Habita denso sotobosque de bosque primario. Los individuos se mueven discretamente en el suelo.

Amenazas: - Modificación, fragmentación y destrucción de hábitat.



Tamaño: 11 cm

FOTOGRAFÍA: Nigel Voaden

Cucarachero de Nicéforo


Thryothorus nicefori (Meyer De Schauensee, 1946)
Troglodytidae

Dorso rufo; superciliar blanco; mejillas y cuello blancos con rayas negras; vientre blancuzco con matices de color castaño y barras negras en el crísum.

Distribución: ENDÉMICO. 1500-1900 m. Se distribuye en la parte central y Nororiental del departamento de Santander.

Ecología: Habita cafetales, bosques riparios y bosque seco donde la vegetación es densa y perenne, con predominio de guamos (Inga spp.) y de gallineros (Pithecellobium dulce), con epífitas.

Amenazas: - Modificación de hábitat.



Tamaño: 14,5 cm

FOTOGRAFÍA: Oswaldo Cortez

Dacnis turquesa o mielero turquesa

Dacnis hartlaubi (Sclater, 1855)
Thraupidae

Macho con plumaje azul; garganta, manto, cola, alas y máscara negros. Hembra con dorso marrón opaco y cabeza grisácea. Ambos sexos presentan iris amarillo.

Distribución: ENDÉMICO. 1000-2200 m. Centro de la cordillera occidental y central, costados oriental y occidental de la cordillera oriental.

Ecología: Habita bosque húmedo, bordes de bosques y claros con árboles esparcidos y cafetales con sombrío, adyacentes a parches de bosque y rastrojo.

Amenazas: - Modificación y destrucción de hábitat.



Tamaño: Promedio 11 cm.

FOTOGRAFÍA: ProAves/www.proaves.org

Chango de montaña

Macroagelaius subalaris (Bissonneau, 1840)
Icteridae

Plumaje opaco negro azulado; zona axilar castaño rufo; pico cónico negro; cola larga levemente redondeada. Ojos oscuros.

Distribución: ENDÉMICO. 2000-3200 m. Habita desde el centro de la cordillera oriental hacia la parte norte de la misma.

Ecología: Habita bosques andinos y subandinos de la cordillera oriental. Se observa en pequeños y ruidosos grupos en los estratos medio y alto del bosque y algunas veces en los bordes de bosque.

Amenazas: - Modificación de hábitat.



Tamaño: 30 cm.

FOTOGRAFÍA: ProAves/www.proaves.org