

Chavarrí, Gritón del Norte
Chauna chavaria (Linnaeus, 1766)
Anhimidae

Cuerpo robusto, dorso negro-grisáceo y vientre claro. Cuello negro. Lados de la cabeza y garganta blancos. Pico negro y curvo. Alas con espolones.

Distribución: Hasta 200 m de altitud. Oriente del Valle del Atrato hasta el occidente de Santa Marta y Cesar. Sur del Magdalena medio hasta el sur de Bolívar.

Ecología: Orillas de ríos de corriente lenta y llanuras inundadas estacionalmente. El nido es una masa de vegetación palustre con 2-7 huevos en octubre-noviembre, sin embargo la reproducción dura todo el año.

Amenazas:

- Extracción de huevos y polluelos, pérdida de hábitat, competencia por recursos, contaminación de hábitats

Tamaño: 76 a 91 cm.



Paujil pico Azul
Crax alberti (Fraser, 1852)
Cracidae

Macho con carúnculas en pico y cera de color azul, cuerpo de color negro y partes inferiores blancas. Hembra pico azul en la base. Vientre castaño. Pecho y cola con líneas blancas.



Distribución: ENDÉMICA. Hasta los 1200 m de altitud. Norte de Bolívar y el bajo valle del Magdalena. Desde Valle del Sinú hasta Magdalena medio.

Ecología: Se reproduce en la estación seca. Anida entre diciembre y marzo, los adultos y polluelos se han observado en marzo y agosto.

Amenazas:

- Tráfico y tenencia ilegal, desplazamiento por especies introducidas, modificación y destrucción de hábitat, contaminación con agroquímicos.

Tamaño: 91 cm.



Paujil copete de piedra
Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766)
Cracidae

Pico rojizo o anaranjado. Protuberancia frontal gris azulada o blancuzca. Patas rosadas o rojizas. Plumaje negro con visos verdosos, el vientre bajo y la cola blancos.

Distribución: 900-1800m. Habita en al Nororiente de Colombia y al Noroccidente de Venezuela.

Ecología: Predomina en barrancos húmedos con sotobosque denso. Evitar bordes de bosque. Los nidos son construidos en marzo y la eclosión se da en mayo.

Amenazas:

Presión por caza.

Tamaño: 91 cm



Perdiz carinera
Odontophorus atrifrons (Allen, 1900)
Odontophoridae

Corona y cresta castaño rojizo. Frente, mejillas, nuca y garganta negras. Anillo ocular gris. Dorso castaño con rayas grises, ante y negras. Alas castañas con barras negras y puntos beige. Vientre marrón grisáceo con rayas castañas. Centro de pecho y vientre con puntos oscuros y claros.

Distribución: 1200-2800m. Zonas montañosas de Santa Marta y Perijá. Norte de la cordillera oriental en Norte de Santander.

Ecología: Es cauteloso y reservado, se alimenta en la densa maleza. En agosto se presenta condición reproductiva y empollamiento y en julio se han observado los juveniles.

Amenazas:

Presión por caza, modificación y destrucción de hábitat.



Tamaño: aprox. 28,5 - 30 cm



Corcovado gorgiblanco, Perdiz santandereana
Odontophorus strophium (Gould, 1844)
Odontophoridae

Macho con cresta pequeña; dorso marrón oscuro con puntos negros; ceja blanca alargada hacia atrás; anillo ocular blanco; garganta y lados del cuello negros con collar blanco. Hembra con garganta blanca y puntos negros en el centro.

Distribución: ENDÉMICA. 1500-1800m. Flanco occidental de la cordillera de los Andes hacia el occidente de Bogotá. En general se distribuye en Cundinamarca y Betulia, Santander.

Ecología: Aunque depende de bosques maduros existen registros en hábitats secundarios y degradados. La temporada de cría está documentada entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre.

Amenazas:

Presión por caza, modificación y destrucción de hábitat.



Tamaño: promedio 28 cm



ndor Andino
Vultur gryphus (Linnaeus, 1758)
Cathartidae

FOTOGRAFÍA: Elkin René Briceno



Tamaño: 142 cm



Cabeza desnuda y de color rojizo. Collar blanco. Pico de borde cortante y terminado en gancho. Alas largas y anchas con una banda blanca. El plumaje juvenil es marrón. Los machos tienen ojos café y cresta evidente en contraste con las hembras sin cresta y ojos rojizos.

Distribución: 1800-5200m. Santa Marta, Puracé, Pasto, Nevados del Cocuy, Huila, y norte del Tolima.

Ecología: Su población se estima en menos de 10.000 individuos, equivalente a 6.700 individuos maduros. Alcanza la madurez sexual a los 8 años.

Amenazas: Persecución humana, modificación y destrucción de hábitat.



Cotorra de cara oxidada / Cotorra montañera
Haplopsittaca amazonina amazonina (D, 1845)
Psittacidae

Frente y rostro rojo óxido, nuca amarilla; pico gris; dorso, corona, vientre y partes inferiores verdes, hombros rojo oscuro; alas azules; plumas de vuelo negras; cola roja con punta azul. Garganta y pecho amarillos.

Distribución: 2.000-3.000m. La sub especies amazonina se distribuye en el oriente de los Andes en Norte de Santander, en el flanco occidental en Santander (Molagavita) y al sur occidente en Bogotá (Fusagasugá).

Ecología: Habita bosque húmedo, bosque nublado rico en epífita, bosque subtropical, matorrales y borde de bosque. Se alimenta principalmente en el dosel de frutas, flores y semillas.

Amenazas:

- Modificación y destrucción de hábitat.



Tamaño: 23 cm.

Cotorra de cabeza azafrán
Pyrrilia pyrrilia (Bonaparte, 1853)
Psittacidae

Corona, cabeza, cuello y hombros de color amarillo; dorso verde y pecho oliva; alas rojizas con franjas azules; plumas de vuelo negruzcas. Cola verde con manchas azules. Patas oliva y pico blancuzco.



Distribución: Hasta 1500 m. Zona alta del Río Sinú. Norte de la cordillera Occidental hasta el occidente del Perijá. Sur del Valle del Magdalena medio.

Ecología: Tierras bajas y estribaciones andinas de Colombia. Interior y borde de bosques maduros, bosques secundarios avanzados y zonas semi abiertas. Se ha observado en grupos familiares o bandadas pequeñas.

Amenazas:

Modificación y destrucción de hábitat.

Tamaño: De 22 a 24 cm



Cotorra pechiparda
Pyrrhura calliptera (Massena & Souancé, 1854)
Psittacidae

Pico levemente amarillo, área ocular blanquecina y desprovista de plumas. Cuerpo verde con corona, garganta y pecho marrón oscuro. Envergadura amarilla a menudo mezclada con naranja.

Distribución: ENDÉMICA. 1700-3400 m. Se distribuye en los flancos de la cordillera oriental desde el sur de Boyacá hasta el suroccidente de Cundinamarca.

Ecología: Habita en bordes de bosque y arbustos, también en áreas adyacentes al páramo, subparamo y agroecosistemas. Migra altitudinalmente. Se reproduce en agosto y octubre y las crías se observan en noviembre y enero.

Amenazas:

- Modificación y destrucción de hábitat.



Tamaño: De 22 a 23 cm



AVES AMENAZADAS DE COLOMBIA PRESENTES EN SANTANDER